



**TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
KỸ THUẬT CHĂN NUÔI RẺN MỎI**

TRANG TRẠI RẺN MỎI 7 CÁ



TÊN KHOA HỌC CỦA RẪN MỐI

Rắn mối có tên khoa học là: *Dasia Olivacea*, *Mabuya Nigropunctata*. Các tên gọi khác của rắn mối ở Việt Nam: rắn thần lằn, thần lằn,...

PHÂN BỐ

Rắn mối phân bố ở các khu vực nhiệt đới, cận nhiệt đới: Châu Á: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Philippin, Brunei, Malaysia,..; Châu Mỹ(Nam Mỹ): Brazil, French Guiana, Guyana, Suriname, Venezuela, Bolivia, Peru, Trinidad, and Tobago.

MÔ TẢ KHÁI QUÁT

Rắn mối là loài bò sát có bốn chân, mỗi chân có móng vuốt sắc bén để thích hợp cho việc leo trèo. Răng của rắn mối khá giống răng sùng(thần lằn), trong răng không có chất độc nên không gây hại cho con người. Bên ngoài thân của nó được bao bọc bởi những lớp vảy rất giống với vảy cá. Dưới ánh nắng mặt trời vảy rắn mối sáng óng ánh. Tùy theo điều kiện khí hậu và khu vực phân bố khác nhau nên rắn mối sẽ có màu sắc, hình dáng và đặc tính di truyền cũng khác nhau.

Rắn mối rất thích leo trèo, lẩn trốn, ẩn náo trên các cây cao hoặc trong bụi rậm, hang ổ để lẩn tránh kẻ thù và đồng thời làm nơi sinh sống. Rắn mối bơi rất giỏi và nổi bồng bênh trên mặt nước.

THÓI QUEN VÀ SỞ THÍCH

Rắn mối có thói quen phơi nắng và đi tìm thức ăn khi mặt trời vừa ló dạng. Quá trình phơi nắng giúp nó mau lớn, tổng hợp vitamin D. Khi có ánh nắng đầy đủ rắn mối sẽ mau chóng thay da và phát triển. Nếu không có nắng rắn mối sẽ không phát triển toàn diện, quá trình thay da sẽ diễn ra chậm hoặc không thể thay da.

Dạng thức ăn mà rắn mối thích: côn trùng “ dế, châu chấu, con mối, trứng kiến, sâu gạo, sâu superworm, sùng rom, ấu trùng, dòi, nhộng, giun đất,...” ; các dạng thức ăn có mùi tanh “ tép, tôm, cá, mỡ heo(lợn), thịt,...”; dạng thức ăn ngọt “ chuối, xoài, dưa hấu,nhãn, chôm chôm,...” Loại thức ăn ngọt chỉ cho ăn bổ sung tạo vitamin.

PHÂN BIỆT RẪN MỐI ĐỤC CÁI

Rắn mối cái: đầu nhỏ, thân thon, vảy rất bóng. Thông thường dễ nhận biết là nó có những chấm tròn đen trắng trên bụng. Có một số loài rắn mối khác không có chấm tròn đen trắng thì phải nhận diện nó dựa vào độ sáng của vảy, phần đầu nhỏ, thân thon. Rắn cái khi mang thai phần bụng to dần ở giữa, nó di chuyển chậm chạp. Rắn mối cái không ăn con của nó.

Rắn mối đực thân, đầu to, vảy thô, di chuyển rất nhanh. Khi cầm con đực trên tay nó gãy giụa mạnh hơn con cái. Rắn đực có rất nhiều loại: loại có thân trắng không có màu sắc khác, loại thì có sọc đỏ bên hông nhưng không có chấm trắng đen trên bụng, loại khác thì có sọc đen trên cạnh lưng và không có chấm đen trắng trên bụng. Rắn đực sẽ ăn con nhỏ mới sinh.




ĐẶC ĐIỂM CỦA RẪN CON MỚI SINH

Rắn con mới sinh mang đặc tính di truyền của bố mẹ: sống độc lập, tự tìm thức ăn, thích ăn côn trùng, tự bảo vệ mình. Do đó, trong tiềm thức của nó chỉ thích ăn côn trùng, sinh sống riêng biệt. Do còn nhỏ nên nó chỉ ăn những con côn trùng nhỏ ví dụ: ấu trùng, trứng kiến nhỏ, dế con mới nở, sâu nhỏ,.. Chúng ta bắt buộc phải tìm những thức ăn dạng này để cho rắn mới nở ăn. Do vậy, chúng ta cần phải chăm sóc con nhỏ thật cẩn thận tránh các con vật khác gây hại.


Cách chăm sóc rắn con : tách rắn con vào ô nuôi riêng – dùng chổi cỏ và đồ hút rác quét nhẹ rắn con vào và tách ra riêng – trong ô nuôi riêng ta xây ổ cho rắn con cuộn tròn bằng rơm rạ, lá chuối,.. Cái ổ này phải làm to và đủ ấm để rắn con sống. Chuồng nuôi con nhỏ phải tránh được mưa và lấy được ánh nắng sáng vào nhưng không được nóng gay gắt. Thức ăn chủ yếu là côn trùng nhỏ: dế nhỏ, sâu nhỏ, trứng kiến nhỏ, châu chấu con,..Chú ý: rắn con không ăn thức ăn thịt, cá, tôm tép,..Chỉ cần cung cấp đủ lượng côn trùng nhỏ đến khi rắn con được một tháng tuổi ta mới cho ăn các thức thường ngày dành cho rắn mới lớn.

KỸ THUẬT

KỸ THUẬT XÂY DỰNG CHUỒNG TRẠI



8 x 18 cm



Dùng gạch ống tròn xếp bên trong chuồng để làm chỗ ở cho rắn mới. Gạch ống tròn ít làm rắn mới bị trầy xước.

Tư vấn: Trang Trại Rắn Mới 7 Cá

ĐiệnThoại: 0949685937 - 016649966053



Ngoài ra bên trong chuồng con phải bỏ thêm lá dừa, chà dừa, rom, hoặc bất cứ lá cây gì có được. Bên cạnh đó trồng thêm rau xanh trong chuồng nuôi. Mục đích tạo cảnh quan giống trong tự nhiên và đồng thời giảm bớt độ tiếp xúc nếu nếu mật độ lớn.

Mái che chuồng nuôi: có thể phân nửa lợp tôn che nắng, phân nửa để trống. Phần che nắng thì nền nên tráng xi măng, xếp gạch lỗ tròn thành nhiều lớp để rắn môi ở. Phần không che thì nền chuồng có thể không tráng xi măng, phần này trồng rau xanh tạo cảnh quan tự nhiên. Chú ý: nền chuồng nên tráng có độ nghiêng và trong chuồng có thiết kế van để thoát nước.



(Ảnh minh họa)

Cách xây chuồng rẻ nhất và tiết kiệm nhất là phương pháp vây tôn lóng. Có nhiều cách làm khi vây tôn: cách 1 “ xây từ đất lên khoảng 3 viên gạch trên đầu gạch ta để chân tôn lên và trám xi măng, chiều cao tôn khoảng 1 mét, xung quanh chuồng đóng cây để giữ tôn ”; cách 2 “ chôn tôn xuống đất và dùng cây để cố định chuồng, chiều cao tôn trên mặt đất khoảng 1,2 mét, độ sâu tôn chôn dưới đất khoảng 25cm ”. Phương pháp này ít tốn kém, tuổi thọ 2,5 năm.



(Ảnh minh họa)

Tư vấn: Trang Trại Rắn Môi 7 Cá
Điện Thoại: 0949685937 - 016649966053



THỨC ĂN CHO RẮN MỐI

Thức ăn dạng côn trùng hoặc các sinh vật tương tự côn trùng: ấu trùng ong, trứng kiến, sùng rơm, trùng quế, gián đất, dòi, dế mèn, châu chấu, sâu bọ, côn trùng khác.

Thức ăn có mùi tanh: tôm tép, cá cơm, ruốc, thịt mỡ (mỡ heo), thịt gà, vịt, trứng gà, trứng vịt, các thức ăn có mùi tanh khác.

Thức ăn ngọt: chuối xiêm, xứ, xoài, dưa hấu, nhãn, chôm chôm, vải thiều, các thức ăn ngọt khác.

CÁCH CHẾ BIẾN THỨC ĂN

Đối với côn trùng ta có thể nuôi thêm để tạo nguồn thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho rắn mối. Các dạng côn trùng có thể nuôi: sâu superworm, sâu gạo, dế, châu chấu, trứng kiến gai đen, trùng quế, sùng rơm, ... Các dạng côn trùng này ở nước ta hiện nay có rất nhiều hộ đã chăn nuôi thành công. Các bạn có thể chọn một mô hình mà mình cảm thấy phù hợp để nuôi làm nguồn thức ăn cho rắn mối. Cách cho ăn: bắt côn trùng và rải đều khắp chuồng, cho rắn ăn đến khi no. Ngày cho ăn hai lần sáng 8 giờ, trưa khoảng 11 giờ. 1000 con cần khoảng 0.5kg đến 1kg côn trùng. Nếu không có khả năng nuôi thì mỗi tháng các bạn mua côn trùng và cho rắn mối ăn khoảng 3 ngày/tháng.

Đối với dạng thức ăn tanh nếu quá to hoặc có gai, có xương ta phải băm nhỏ, có thể trộn với cơm hoặc thức ăn công nghiệp. 1000 con cần khoảng 1kg-2kg thức ăn tùy thuộc điều kiện. Không cho rắn mối ăn thức ăn ôi thui, thức ăn phải tươi. Nên cho ăn vừa đủ không cho ăn quá mức. Thức ăn tanh nên để tươi không cần nấu chín vì nấu chín rắn mối sẽ không thích. Ví dụ: 3 trứng vịt, gà trộn với 1kg gạo đã nấu cơm cho khoảng 1000 con rắn mối; mỡ thịt băm nhỏ nhúng sơ qua nước sôi rồi trộn với cơm hoặc thức ăn công nghiệp như trên cho 1000 con; tôm, tép, cá cũng làm tương tự nếu nhỏ thì vẫn để nguyên và cho rắn mối ăn.

Đối với thức ăn ngọt chỉ để bổ sung vitamin, có thể xem là thức ăn tráng miệng. Dạng này rắn mối ăn không mạnh bằng thức ăn tanh. Nó chỉ dùng làm thức ăn phụ hỗ trợ thức ăn chín. Chế biến: chuối xiêm chẻ làm 4 phần bỏ vào chuồng, các dạng thức ăn ngọt khác chẻ nhỏ vừa phải và bỏ vào chuồng.

CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH PHÒNG - CHỮA BỆNH

✘ BỆNH BẠI LIỆT

Nguyên nhân: có hai trường hợp gây rắn mối bị liệt. Trường hợp một: mật độ nuôi quá dày nên các con rắn mối dẫm đạp lên nhau. Trường hợp hai: do thiếu các vitamin và canxi, có thể do vi khuẩn phát sinh do chuồng nuôi bị bẩn gây bệnh rắn mối.

Cách khắc phục: Trường hợp mật nuôi dày phải tách bớt lượng rắn mối thừa sang chuồng nuôi khác. Mật độ 100 con/m² là vừa đủ. Trường hợp hai ta phải vệ sinh sạch sẽ chuồng trại, nếu thấy chuồng quá bẩn phải vệ sinh cho sạch sẽ, nước uống thì phải thay mới mỗi ngày mới không gây bệnh cho rắn mối.

Tư vấn: Trang Trại Rắn Mối 7 Cá

Điện Thoại: 0949685937 - 016649966053



Nếu tình hình xảy ra nghiêm trọng ta có thể dùng Dung Vime Iodine (loại dung cho thú y) **15ml/ 4 lít** nước phun thẳng lên mình rắn đồng thời phun vệ sinh chuồng trại.

Bổ sung vitamin cho rắn mỗi: mỗi tháng cho rắn mỗi ăn côn trùng 3-4 lần, cho rắn dùng các loại vitamin bổ sung dùng cho chim cú, heo, bò gà(chú ý pha vào thức ăn hoặc nước uống lượng vừa phải). Premix Calphovit để bổ sung cho rắn mỗi (**1 g/10 kg thể trọng**). Hai tuần trộn thức ăn hoặc nước uống cho ăn liên tục 5 ngày. **Multi-Ferm** mỗi ngày cho ăn trộn tỷ lệ 3 muỗng cà phê trên 3kg thức ăn. Thuốc hỗ trợ tiêu hóa: **Pharmalox** hòa nước, tỷ lệ pha trộn 1g/2 lít (1 muỗng nhỏ cà phê).

⊗ BỆNH ĐẸN MIỆNG

Dấu hiệu nhận biết: rắn hay mở miệng to và trong miệng có nhiều chất nhớt cản trở quá trình hô hấp của rắn mỗi.

Cách khắc phục: vệ sinh sạch sẽ chuồng trại, tách rắn mỗi bệnh sang chuồng riêng theo dõi điều trị. Thuốc điều trị: **Pharmalox** hòa nước hoặc trộn vào thức ăn, tỷ lệ pha trộn 1g/2 lít nước và 1g/2kg thức ăn.

⊗ BỆNH CÒI XƯƠNG

Nguyên nhân: rắn mỗi bị thiếu ăn do mật độ nuôi nhiều, rắn bị nhiễm giun sán do chuồng nuôi bị bẩn, thiếu vitamin D do thiếu ánh nắng.

Cách khắc phục: Vệ sinh sạch sẽ chuồng trại, khi để thức ăn cho rắn mỗi nên để đều các góc cạnh trong chuồng để tránh bị hiện tượng con ăn nhiều, con ăn ít. Chuồng trại đảm bảo ánh nắng, thoáng, sạch sẽ. Phải bổ sung thêm các vitamin như đã nêu ở các phần trên. Tẩy giun sán định kỳ 2-3 tháng một lần – thuốc mua tại các cơ sở thú y.

HỎI ĐÁP

Khi rắn mỗi mang thai ta phải làm gì?

Trả lời: Khi rắn mỗi mang thai phần bụng sẽ to tròn, ta chỉ cần bắt con cái và bỏ vào chuồng riêng để cho rắn mỗi sinh sản. Trong chuồng rắn mỗi sinh sản phải xây cái ổ thật to, thật ấm cho rắn mỗi sinh sản. Vật liệu làm ổ có thể là rơm, rạ, lá chuối, bẹ chuối khô đã mục, hoặc bất cứ vật liệu nào khác có thể làm ổ. Chế độ dinh dưỡng nên bổ sung vitamin, cho ăn thêm côn trùng.

Rắn mỗi đẻ con hay đẻ trứng?

Trả lời: Rắn mỗi đẻ con, mỗi lần mang thai có thể từ 2 tới 9 con tùy vào con cái to hay nhỏ.



Tư vấn: Trang Trại Rắn Mỗi 7 Cá

ĐiệnThoại: 0949685937 - 016649966053



Rắn mỗi con cho ăn gì?

Trả lời: Xem lại phần tổng quát “ Đặc điểm rắn mỗi con ”. Do còn nhỏ nên rắn con chỉ ăn những con côn trùng nhỏ ví dụ: ấu trùng, trứng kiến nhỏ, dế con mới nở, sâu nhỏ,.. Chúng ta bắt buộc phải tìm những thức ăn dạng này để cho rắn mỗi nhỏ ăn. Rắn mỗi con không ăn các dạng thức ăn to hơn miệng hoặc thức ăn không phải là côn trùng nhỏ.

Chăm sóc rắn mỗi con như thế nào?

Trả lời: Sau khi con nhỏ ra đời ta nên tách con nhỏ khỏi mẹ nó và nuôi riêng. Bỏ vào ô nuôi nhỏ có làm ô bằng rơm cao khoảng 60 cm và to để rắn mỗi nhỏ ở. Chú ý chuồng nuôi phải có nắng. Nếu chuồng nuôi rộng từ 100 m² vuông trở lên ta có thể xây cây rơm cao khoảng 2m để vừa là nơi trú cho rắn mỗi con, đồng thời là nơi sản sinh côn trùng cho rắn mỗi con ăn ta ít tốn công chăm sóc.

Một kilogram rắn mỗi có bao nhiêu con?

Trả lời: 1kg rắn mỗi trưởng thành thường khoảng 18 con tới 30 con. Đạt tiêu chuẩn thịt loại 1: 18 con tới 28 con/kg. Tiêu chuẩn thịt loại 2: 28 con tới 32 con/kg. Tiêu chuẩn thịt loại 3: khoảng 32 tới 25 con/kg. Rắn mỗi thịt loại 1 sẽ đạt được giá cao nhất.

Cho rắn mỗi ăn thức ăn ôi thiu có ảnh hưởng gì không?

Trả lời: Thức ăn ôi thiu có chứa rất nhiều vi khuẩn phân hủy xác nên rất nguy hiểm và độc hại cho rắn mỗi có thể gây bệnh đường ruột, giun sán kí sinh, và các bệnh khác. Do đó, các bạn không nên cho rắn mỗi ăn thức ăn đã ôi thiu đang trong quá trình phân hủy.

Rắn mỗi có ăn con của nó không?

Trả lời: Rắn mỗi đực sẽ ăn con còn rắn mỗi cái thì không ăn. Do đó khi rắn mỗi cái mang thai phải tách sang chuồng riêng để cho rắn mỗi cái sinh sản.

Rắn mỗi có ăn thịt lẫn nhau không?

Trả lời: Rắn mỗi *không* ăn thịt lẫn nhau chỉ có con đực là ăn con rắn mỗi mới sinh. Một vài trường hợp hiếm gặp rắn mỗi ăn thịt con rắn mỗi đã bị chết. Trường hợp này do thiếu thức ăn nên nó hành động theo bản năng động vật.

Tại sao có trường hợp nuôi bị chết hàng loạt?

Trả lời: Rắn mỗi chỉ chết hàng loạt do mật số nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là do mật độ nuôi quá dày, rắn mỗi chen chúc dẫm đạp nhau trên một diện tích nuôi quá nhỏ. Biểu hiện của rắn mỗi bị trầy trụa (khác với rắn mỗi tróc vảy lớn), có con mắt bị mù một mắt. Cách giải quyết: tách bớt rắn mỗi sang chuồng nuôi khác, mật độ vừa phải: 100 con/ m². Ví dụ: 10 m² nuôi được 1000 con nhưng trong chuồng phải xếp gạch và các vật liệu để làm chỗ ở cho rắn mỗi phù hợp.



Nguyên nhân thứ hai là do rắn mối bị nhiễm bệnh do giun sán kí sinh, do nấm bệnh phát triển. Trường hợp này xảy ra khi chuồng nuôi mất vệ sinh, mưa kéo dài không có nắng. Cách khắc phục: vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, dùng Vime Iodine (loại dùng cho thú y) **15ml/ 4 lít** phun xịt chuồng trại hoặc bắt hết rắn mối ra ngoài sau đó ngâm vôi khoảng 3 giờ đến 5 giờ để vệ sinh chuồng.

Một mét vuông nuôi được bao nhiêu con rắn mối?

Trả lời: Một mét vuông nuôi được khoảng 100 con, 10 mét vuông nuôi được 1000 con. Trong chuồng phải sắp xếp thích hợp.

Rắn mối có chữa được bệnh gì không?

Trả lời: Chưa có thí nghiệm khoa học chứng minh rằng rắn mối có thể chữa bệnh. Nhưng trong dân gian người ta dùng rắn mối để trị bệnh hen suyễn.

Tại sao rắn mối con mới sinh bị chết?

Trả lời: Có hai trường hợp kiến rắn mối nhỏ bị chết. Thứ nhất rắn mối con không đủ ấm, không có chỗ trú ẩn. Trường hợp này chỉ cần làm ổ cho rắn mối con là được. Ổ bằng rom tròn càng to càng tốt. Trường hợp thứ hai rắn mối thiếu thức ăn, không ăn được các dạng thức ăn khá lạ do chúng ta cung cấp. Cách khắc phục: Nuôi để lấy để con mới sinh cho rắn mối ăn, hoặc tìm ổ mối đất có con thật nhỏ cho rắn mối con ăn (không cho ăn mối vàng hoặc mối to), hoặc tìm trứng kiến đã được lượt bỏ các con kiến, hoặc tìm các con côn trùng khác nhỏ vừa cỡ miệng rắn con. Chỉ cần nuôi như thế khoảng 1 tháng là ta có thể tập cho ăn các thức ăn gia đình như rắn mối lớn.

Rắn mối cắn có chết không?

Trả lời: Rắn mối không có răng nanh cũng như không có nọc độc nên rắn mối cắn không ảnh hưởng gì tới chúng ta. Rắn mối chỉ có những răng nhỏ li ti như thạch sùng (thần lằn). Tại sao nó lại có phản ứng cắn chúng ta? Nó chỉ cắn khi chúng ta làm đau nó hoặc chúng ta bắt nó mạnh tay. Rắn đực hay phản ứng mạnh hơn khi tay làm đau nó.

Cách cầm rắn mối trên tay như thế nào mà không làm tổn thương rắn mối?

Trả lời: Khi ta cầm rắn mối trên tay nó giãy giụa rất nhiều phải không? Có khi nó còn có phản ứng cắn lại chúng ta nữa. Vậy thì cách nào cầm là đúng? Chú ý khi cầm hay bắt rắn mối, ta nên bắt rắn mối theo chiều đầu rắn mối sẽ hướng vào lòng bàn tay, có nghĩa là ta bắt từ “**đầu tới phần đuôi**”. Cách bắt này rắn mối không có cách nào giãy giụa hay có phản ứng mạnh đồng thời không làm tổn thương nó.

Từ con nhỏ mới sinh tới khi trưởng thành mất bao lâu?

Trả lời: Từ khi mới sinh đến khi rắn mối trưởng thành mất khoảng 6 tháng đến 8 tháng tuổi. Lúc này ta nên cân thử xem rắn mối có đủ tiêu chuẩn để xuất thịt chưa? Nếu chưa ta phải nuôi bổ sung thêm dinh dưỡng để đủ tiêu chuẩn thịt.



Trong quá trình phát triển của rắn mỗi giai đoạn nào khó nuôi nhất?

Trả lời: Trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rắn mỗi thì giai đoạn rắn mới con mới sinh ra là khó nuôi nhất. Vì còn nhỏ nên khả năng kháng bệnh thấp, thức ăn cho rắn mới con khó tìm. Cách khắc phục: “xem mục cách nuôi rắn mới con”.

Mỡ rắn mới dùng để làm gì?

Trả lời: Chiết xuất mỡ rắn mới dùng để làm mỹ phẩm dưỡng da cho phụ nữ và các sản phẩm khác.

Quá trình vận chuyển có ảnh hưởng gì tới chất lượng của rắn mới trong tương lai không?

Trả lời: Quá trình vận chuyển con giống từ nơi này sang nơi khác nếu không tính toán cẩn thận sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Nếu đựng số lượng lớn rắn mới trong một thùng đựng quá chật chội sẽ làm rắn mới đạp lên nhau, trầy xước, và có thể bị ngộp chết. Sau khi vận chuyển rắn về nhà nếu trong tuần đầu tiên không thấy rắn mới chết chứng tỏ quá trình vận chuyển tốt, ngược lại thấy rắn mới chết dần chứng tỏ quá trình vận chuyển không tốt. **Cách khắc phục:** chuẩn bị nhiều thùng xốp có khả năng cách nhiệt, có xôm lỗ thông khí. Mỗi thùng chỉ đựng một số lượng rắn vừa phải để tránh rắn bị ngộp. Bên trong thùng bỏ thêm một số vật liệu tránh ma sát lẫn nhau giữa các con rắn mới, ví dụ: lá chuối, lá cây tron bất kỳ không có độ nhám. Chú ý khi vận chuyển nên tránh ánh nắng gay gắt.

Rắn mới cắn và rượt đuổi nhau có ảnh hưởng gì không?

Trả lời: Rắn mới rượt đuổi và cắn nhau chỉ là hiện tượng bình thường do tính hiếu động, trong tự nhiên cũng thế. Có một số hộ chăn nuôi hỏi tại sao rắn mới cắn đuôi nhau rồi chết? Đây chỉ là sự nhầm lẫn, rắn mới không cắn nhau chết. Rắn mới chết có thể do bị vi khuẩn phát sinh trong chuồng trại, thiếu ăn, thiếu vitamin, hoặc quá trình vận chuyển giống rắn giẫm đạp nhau,... Cách khắc phục: giống những phương pháp đã nêu ở các phần trên.

Làm thịt rắn mới như thế nào?

Trả lời: Có rất nhiều cách làm thịt rắn mới, tùy vào món ăn mà sẽ có những cách chế biến khác nhau. Rắn mới nướng: để cả nguyên con và nướng chín, khi chín ta chỉ cạo vảy và để lên đĩa; Rắn mới xào thì ta cắt đầu, mổ bụng, lột da giữ phần đuôi; Rắn mới nấu cháo, hầm thì ta chỉ cạo vảy và mổ bụng “cạo vảy bằng cách hơ lửa hoặc nhúng sơ nước sôi”; Ngoài ra còn rất nhiều cách chế biến khác đang chờ các bạn tạo ra.